

Cíviss Parképítő Kft.

Cím: 4033 Debrecen, Apafája u. 25.

Web: www.civispark.hu

E-mail: info@civispark.hu



Gyeptelepítési és gondozási segédlet

1. Fűmagvetés

Fűmagvetésre a legalkalmasabb időszak a *kora tavasz* (március vége, április eleje) és a *kora ősz* (augusztus vége, szeptember eleje), bár elvileg fagymentes időben bármikor végezhető. Azonban nem mindegy, hogy vetés után milyen gyorsan és egyenletesen kel ki a fű, vagy mennyi utógondozást fog igényelni a megerősödésig.

Tavasszal még elég nedvesség marad a téli csapadék után a talajban és a hőmérséklet is megfelelő a fűmag csírázásának beindulásához. (A fűmag kb. +5°C hőmérséklettől kezd csírázni, de a legoptimálisabb a +15-21°C.) Ebben az évszakban az alacsony talajhőmérséklet miatt lassabban kel ki a fű, így a gyomosodás hamarabb megindulhat. A hirtelen jött meleg sem kedvező, mert ebben az esetben a talaj könnyen kiszáradhat, ami károsíthatja a fűmagokat.

Az őszi füvesítés jellemzően jobb a tavaszinál. Ekkor ugyanis sok a csapadék és jelentős a harmatképződés, valamint a hőmérséklet is megfelelő. A meleg igényes gyomok azonban az esti lehülések miatt nehezebben bújnak elő, így a fűünk nagy eséllyel gyommentes maradhat. Azonban ha túl sokáig várunk, akkor egyrészt a késő őszi bőséges csapadékmennyiség a fűmagokat összemoshatja, így nem lesz egyenletes a fűfelületünk; másrészt a hűvös idő miatt lehet nem kel ki a fűmagok egy része. Ezek többsége tavasszal, mikor már elég meleg van a csírázáshoz, kibújik.

Fűmagvetés nyáron is lehetséges, azonban ekkor oda kell figyelni a megfelelő öntözésre és arra, hogy melegben, öntözés mellett a frissen kikelt fű hajlamos a gombabetegségekre!

1.1.A terület gyommentesítése

A terepmunkák megkezdése előtt kb. 2-3 héttel kell a gyomirtást elvégezni. Ezt totális vegyszeres gyomirtással (Glialka, Medallon) érdemes végezni, hogy az élévő gyomok is kipusztuljanak. Gyomirtásra a legoptimálisabbak a kora hajnali vagy késő esti órák, mert ilyenkor a vegyszerek kevésbé párolognak. Növeli a gyomirtás hatékonyságát, ha az oldathoz hatásfokozó adalékot adunk (pl. Nonit). Minél melegebb van, annál hamarabb száradnak le a gyomok föld feletti, zöld részei (kb. 2-3 hét). A nedvesség azonban gátolja a szerek felszívódását.

Az elpusztult gyomokat rotálással, kapálással el kell távolítani, lehetőleg gyökerestől; majd a kiforgatott növényi részeket összegyűjteni és elszállítani a területről.

Ezt válthatjuk ki gyepnyeséssel, ami végezhető lapáttal, vagy kimondottan erre a célra kifejlesztett géppel.

A gyepnyesést, gyommentesítést követően kerülhet sor az öntözőrendszer telepítésére, amennyiben igény van rá.

Cíviss Parképítő Kft.

Cím: 4033 Debrecen, Apafája u. 25.

Web: www.civispark.hu

E-mail: info@civispark.hu



1.2.A talajfelszín előkészítése

A fellazított, gyommentes talajt el kell egyengetni és le kell tömöríteni. Ekkor van lehetőség az esetleg hiányzó földmennyiség pótlására is.

Érdemes hagyni 1-2 hétig ülepedni, majd ha szükséges, újra egyengetni. Ez az idő arra is elég, hogy a csírázó gyomokat is el tudjuk távolítani a területről (vagy mechanikusan vagy újabb vegyszeres gyomirtással – ez utóbbi esetben újra várnunk kell mielőtt kiszóránk a fűmagot). Az talajt a fűmagvetés előtti napon érdemes beöntözni (kb. 20 l/ m²).

1.3.Fűmagvetés

A fűmagot a csomagoláson feltüntetett mennyiségben (ez ált. 3 dkg/m²) juttassuk ki a területre. Kisebb területek esetén ez megoldható kézzel (bár így nehezebb az egyenletes fűmagkijuttatás). Nagyobb területeknél érdemes szóró kocsit/gépi vetést alkalmazni.

A fűmagot vagy a gereblye fejével, vagy egy lapát lapjával bevergetjük a talajba, vagy betapossuk. Ha van rá lehetőség, akkor használjunk hengert erre a célra. Ez azért szükséges, hogy a fűmagokat ne vigye el a szél.

1.4.Utógondozás

Érdemes indító műtrágyát is kijuttatunk a területre.

Ezután jöhet az öntözés. Ha nincs automata öntözőrendszer telepítve, akkor vigyázzunk, hogy a slagra mindenképpen csatlakoztassunk szórófejet, amivel porlasztható a vízszugár; mert ha erős, egyszugarú öntözést alkalmazunk, akkor összemosódnak a fűmagok.

Az első 2 hétben érdemes naponta 3-5 alkalommal finoman öntözni a fűvesített területet. A csírázás kb. a 10. napig elkezdődik és az intenzív növekedés a 10-20. napig tart kb.

Miután a fűünk megerősödött, át kell térni a napi egyszeri, bőséges öntözéshez (hajnali órákban), mer így alakul ki szép, mély gyökérrendszere a gyeplünknek. Ha naponta többször és kis mennyiségű vizet juttatunk ki, akkor egyrészt a nedvességet kedvelő kórokozók hamarabb megtámadják a gyeplőt, másrésztől sekélyen fog gyökeresedni. Ez azért baj, mert így a mechanikai kitételnek kevésbé lesz ellenálló, illetve hamarabb kiszárad a fű, ha pl. elromlik az öntözőrendszerünk és nem vesszük egyből észre.

Az első kaszálásra általában 30 nap múlva van szükség, mikor a fű már 6-8 cm magasra megnőtt. Ilyenkor éles késű géppel, kb. az 1/3-ával vágjuk vissza a fűvet és a nyeseleket összegyűjtjük. Kb. 3 vágásra van szükség addig, mire kialakul egy összefüggő gyeplőfelület.

Az 1/3-os szabályt érdemes betartani mert ha túl gyakran és túl rövidre vágjuk a fűvet, akkor a levelek árnyékoló hatása nem érvényesül és sekélyebb gyökérszövet alakul ki, hiszen nincs elég fotoszintetizáló zöld rész, ami elvégezné a gyökérfejlődéshez szükséges energia előállítását. Ezáltal a gyeplő hamarabb kiszárad.

Cívis Parképítő Kft.

Cím: 4033 Debrecen, Apafája u. 25.

Web: www.civispark.hu

E-mail: info@civispark.hu



2. Gyepszőnyegterítés

A gyepszőnyeg terítése előtt ugyanazokat a munkálatokat kell elvégezni, mint fűmagvetés előtt.

Ha már rászánjuk magunkat a „kész gyepr” telepítésére, akkor ne sajnáljuk azt a négyzetméterenként plusz 200-300 Ft-ot a vakondhálóra, mert ellenkező esetben lehet már a telepítést követő napon vakondtúrásokkal lesz tele a szép új pázsit.

Előírászerűen a végső terepszint alá 10 cm-rel kell rakni a vakondhálót és rá a földet, majd a gyepszőnyeget. Tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy hiába hajtjuk vissza a széleken a hálót, a vakond megtalálja az utat a háló és a gyepszőnyeg közé, és vígan dúlja azt. Így mi inkább azt szoktuk javasolni, hogy a vakondháló közvetlenül a gyepszőnyeg alá kerüljön.

A vakondháló terítése után szórjuk ki a gyepszőnyeg begyökeresedését elősegítő indító műtrágyát (Everris New Grass műtrágya – gyártó javaslata szerinti mennyiségben).

A terítésnél a szélek pontos, szoros összeillesztésére kell figyelni.

Illetve nem szabad sokáig tárolni (főleg összetekert állapotban) a gyepszőnyeget. Lehetőség szerint az áru érkezése után azonnal érdemes lerakni. Ellenkező esetben bepállhat, bepenészedhet, vagy éppen kiszáradhat a gyepszőnyeg.

Ha mégis tárolásra kényszerülünk, akkor lehetőség szerint terítsük ki és öntözzük meg.

A gyepszőnyeg utógondozása

Nagyon fontos a gyepszőnyeg telepítés utáni gondozása.

Lerakás után azonnal be kell öntözni (kb. 15 l víz/m²). Érdemes megemelni a gyepszőnyeg szélét és ellenőrizni, hogy az altalaj is kellően átnedvesedett-e.

2.1. Legyökeresedési időszak (terítés utáni 8-14. nap)

- A gyepet rendszeresen öntözni kell (kb. 5 l víz/m²/nap)
- Az első fűnyírást a 6-8. napon végezzük, mikor már azt látjuk, hogy a fűszálak kezdenek megdőlni. A vágási magasság 5-6 cm.
- A 2. nyírást 2-3 nappal az 1. után végezzük el. A vágási magasság 4 cm legyen.

2.2. Átmeneti időszak (terítés utáni 3-5. hét)

- A gyepet rendszeresen öntözni kell (kb. 10 l víz/m²/hetente 2-3 alkalommal)
- Fűnyírást hetente kétszer. Vágási magasság 4 cm, árnyékban 5-6 cm.

2.3. Végső fázisban (terítés utáni 6. héttől)

- A gyepet rendszeresen öntözni kell (kb. 30 l víz/m²/hetente 1 alkalommal, nagy szárazságban 2 alkalommal)

Cívis Parképítő Kft.

Cím: 4033 Debrecen, Apafája u. 25.

Web: www.civispark.hu

E-mail: info@civispark.hu



2.4. Műtrágyázás

- 4-6 héttel a gyepszőnyegterítést követően (Everris gyepfenntartó műtrágya – gyártó javaslata szerinti mennyiségben).
- A műtrágya kiszórása után öntözzük be a területet (kb. 10-15 l víz/m²)
- A nyári műtrágyázást legkésőbb augusztus végéig el kell végezni!

2.5. Tavaszi gondozás

- Március végén gyepszellőztetés, gyepplazítás, műtrágyázás
- Május közepén, végén újabb műtrágyázás

2.6. Őszi gondozás

- Szeptember elején, közepén gyepszellőztetés
- Október közepén műtrágyázás
- November elején, közepén gombaölő permetezés

Cívis Parképítő Kft.